

Алгоритм действий при подъеме ОРВИ, гриппа в детском учреждении

1. Выявить источник (причину) возникновения ОРВИ, гриппа.
2. Вывести заболевшего из коллектива детей (осмотреть ребенка, измерить температуру, оказать доврачебную помощь).
3. Сделать вызов родителей к заболевшему.
4. Провести инструктаж с работниками группы.
5. Провести заключительную дезинфекцию силами работников группы:
 - посуда, ветошь, мочалки замачиваются путем погружения по режиму дезинфекции при вирусной инфекции;
 - поверхности (стены, двери, батареи, мебель и др.) протираются (1 т. «Жавилар Эффект» на 10 л. воды);
 - игрушки замачиваются в дез.р-ре (1 т. «Жавилар Эффект» на 10 л. воды),мягкие игрушки - простираются, кварцаются;
 - постельное белье, полотенца, шторы простираять, замочив в дез. р-ре;
 - ковры обрабатываются пылесосом, протиранием дез.р-ром, кварцаются и убираются;
 - уборочный инвентарь замачивается в дез.р-р (14т. «Жавилар Эффект» на 10 л. воды на 2 часа);
- Все дни карантина проводится текущая дезинфекция ср-вом «Жавилар Эффект» по режиму вирусной инфекции.
6. Принимать детей в группе: проводить измерения температуры утром и вечером, осматривать зев, вести лист наблюдения за контактными детьми,
7. Вести экран заболеваемости по ОРВИ и гриппу, ежедневно анализировать заболеваемость в группе.
8. Персонал группы используют 4-х слойные маски со сменой через 4 часа.
9. Исключить массовые мероприятия и занятия вне группы.
10. Проводить профилактические мероприятия:
 - полоскание рта, горла детям с использованием трав, кипяченой воды (t воды на 2°C выше комн.) 2 раза/день;
 - в носовые ходы закладывать оксолиновую мазь,виферон
 - прием поливитаминов;
 - аэрация воздуха фитонцидами.
11. Соблюдать тепловой режим в групповых помещениях, кварцевание и проветривание помещения по графику.
12. Не сокращать прогулки по времени. Не допускать переохлаждения детей.
13. В питании детей использовать лук, чеснок (по согласованию с родителями).
14. Вновь поступающие дети в ДОУ не принимаются.
15. При подъеме заболеваемости выше 20%-25% от списочного состава на группу наложить карантин на 7 дней. Сообщить о закрытии группы в департамент образования, эпидотдел Роспотребнадзора и в детскую поликлинику.
16. Контактные дети по ОРВИ и гриппу в другие группы не переводятся.
17. Принимать детей по окончании карантина со справкой от участкового врача детской поликлиники.
18. В группе повести заключительную дезинфекцию по режиму обработки дез. средствами при вирусной инфекции.